

Title	出生時体重と生活習慣病発症の関連における縦断的検討
Sub Title	The longitudinal analysis of the relationship between birth weight and life-style related disease.
Author	武田, 彩乃(Takeda, Ayano)
Publisher	慶應義塾大学
Publication year	2018
Jtitle	学事振興資金研究成果実績報告書 (2017. )
JaLC DOI	
Abstract	

研究代表者	所属	保健管理センター	職名	専任講師	補助額	450	千円
	氏名	武田 彩乃	氏名（英語）	Ayano Takeda			
研究課題（日本語）							
出生時体重と生活習慣病発症の関連における縦断的検討							
研究課題（英訳）							
The longitudinal analysis of the relationship between birth weight and life-style related disease.							
研究組織							
氏名 Name		所属・学科・職名 Affiliation, department, and position					
武田彩乃 (Ayano Takeda)		保健管理センター・専任講師					
畔上達彦 (Tatsuhiko Azegami)		保健管理センター・助教					
河邊博史 (Hiroshi Kawabe)		保健管理センター・所長・教授					
1. 研究成果実績の概要							
<p>2007年から2014年に慶應義塾女子高等学校に在籍し、同意が得られた生徒のうち、出生時体重の申告のあった618名を対象として解析を行った。入学時の健康診断で得られた、身体所見（身長・体重・BMI・血圧）および各種血液検査所見の解析では、8年間の推移で、平均血圧の上昇、中性脂肪の上昇を認めた。また血清クレアチニンが有意に上昇し、それに伴って推定糸球体濾過量（eGFR）が低下していることが判明した。母子手帳の調査によると8年間で出生時体重は年々低下、妊娠週数の短縮化も認めた。各年代における、軽度腎機能障害（eGFR60ml/min未満）、低出生体重（出生時体重2500g未満）の生徒の割合は有意に増加して推移した。ロジスティック回帰分析により軽度腎機能障害となる危険因子を検討したところ、低出生体重児は出生時体重3000g以上の生徒に比してオッズ比3.3(p=0.017)と有意な結果であった。また平均血圧、尿酸値、総コレステロール値も同様に軽度腎機能障害の危険因子となることが判明した。なおこれらの結果は、妊娠週数による影響を除外するために行った妊娠週数37週以降の生徒に限った検討においても同様であった。以上より、低出生体重は他の生活習慣病指標とともに、高校生女子における軽度腎機能障害の危険因子となることが示唆された。同期間の高校生男子1736名についても同様の解析を行ったところ、低出生体重児は出生時体重3000g以上の生徒に比してオッズ比1.73(p=0.031)、また現在過体重である生徒は正常体重である生徒に比してオッズ比1.98(p&lt;0.0001)であり、低出生体重と現在の体重が軽度腎機能障害の危険因子であった。低出生体重は男女ともに若年期の軽度腎機能障害の危険因子となることが示唆された。</p>							
2. 研究成果実績の概要（英訳）							
<p>The aim of this study was evaluating the relationship between birth weight and renal function of healthy female Japanese adolescents aged 15–16 years who were studying at Keio Girls' High School during 2007–2014. Their mean blood pressure (BP) and serum Triglyceride (TG) level increased significantly from 2007 to 2014. There was a significant decrease in estimated glomerular filtration rate (eGFR) over time. Trends in birth weight decreased and in their gestational week became shortened across 8 years. The prevalence of mild renal dysfunction (eGFR &lt; 60ml/min) and low birth weight (LBW; birthweight &lt; 2500g) increased significantly. The interactions between mild renal dysfunction and various risk factors were investigated by using multiple logistic regression analysis. Their birth weight, uric acid, total cholesterol and mean BP were the predictive risk factors for mild renal dysfunction. The odds ratio (OR) of the LBW group according to birth weight for mild renal dysfunction was high (OR, 3.30; p = 0.0171). These results were same in the group except for the preterm birth. We also investigated the interactions between mild renal dysfunction and various risk factors in 1736 male Japanese adolescents. Their birth weight and current body weight were the predictive risk factors for mild renal dysfunction (the OR; LBW, 1.73, p=0.031; current over weight, 1.98, p&lt;0.0001).</p>							
3. 本研究課題に関する発表							
発表者氏名 (著者・講演者)	発表課題名 (著書名・演題)	発表学術誌名 (著書発行所・講演学会)	学術誌発行年月 (著書発行年月・講演年月)				
武田彩乃、神田武志、西村知泰、牧野伸司、横山裕一、和井内由充子、森正明、河邊博史	若年女子における腎機能と出生時体重の推移	第114回日本内科学会総会・講演会	2017年4月				
武田彩乃、神田武志、河邊博史	若年女子における出生時体重と腎機能の関係	第60回日本腎臓学会学術総会	2017年6月				